

## ご注意

- 特に、高齢者、小児の方は、お薬を飲み込むときに気管に入り、呼吸困難などを起こすおそれがありますので、ご注意ください。
- 目には使用しないでください。
- 小児の手の届かない所で、高温をさけて涼しい場所に保管してください。
- 主治医より特に指示がある場合には、それに従ってください。

## お願い

お薬は飲み合わせによって副作用を生じることがあります。

このお薬を服用中に他の病院にかかる場合には、その主治医または薬剤師の方にこの小冊子を示して、このお薬を服用していることをお伝えください。

不明な点がありましたら、主治医または薬剤師にご相談ください。

医療機関名

D6298101E(A-1109A)

患者様へ

口腔・食道カンジダ症治療剤

# フロリードゲル経口用2%

20gチューブ

## ご使用方法

### 口腔カンジダ症とは



■「カンジタ菌」(カビの一種)の異常繁殖が原因で発症します。

■頬の内側や口蓋(上あご)、舌にさまざまな症状が出ます。

■お子さま、お年寄り、糖尿病の方や唾液が少なく口が乾く方などは注意が必要です。

■ほかの病気の原因になる可能性もありますので、早めの治療が大切です。



## フロリードゲル経口用 2% の効果的な使い方

1

- まず、うがいをして口の中を清潔にしてください。
- キャップ先端のとがった部分でチューブに穴をあけてください。



2

主治医から指示されたお薬の1回量を清潔な専用スプーンにとります。



2.5g計量の目安



5g計量の目安

3

お薬を口に含みます。  
お薬の量が多い場合は、少しずつ分けて口に含むようにしてください。



4

- お薬を含んだら、舌でまんべんなく口の中にぬりひろげてください。
- この状態で、できるだけ長く口の中に含んだあと飲み込んでください。
- 入れ歯の方は、よく洗浄して入れ歯にも少しお薬を付けましょう。



5

- 使用後のスプーンはよく洗浄し、清潔に保管してください。
- 服用後、少なくとも1時間位は、うがい、歯みがき、飲食をしないようにしてください。

